Corrigé de l'exercice 1

- ▶1. a) f(6,2) < f(7,8) car 6,2 < 7,8 et f est croissante sur [5; 9].
 - **b)** f(0.8) > f(3.5) car 0.8 < 3.5 et f est décroissante sur [-1; 5].
 - c) f(-6,7) = f(-6,4) car -6,7 < -6,4 et f est constante sur [-7; -6].
- ▶2. f(-7,7) < f(0,6) car d'après le signe de la fonction f(-7,7) < 0 et f(0,6) > 0 (par contre, on ne peut pas utiliser le sens de variation qui change sur l'intervalle [-7,7;0,6]).
- ▶3. On ne peut pas comparer f(-7,2) et f(6,9) car la fonction f n'est pas monotone (elle change de sens de variation) sur [-7,2; 6,9].

Corrigé de l'exercice 2

- ▶1. a) f(-9,2) < f(-7,7) car -9,2 < -7,7 et f est croissante sur [-10; -7].
 - **b)** f(-0,1) = f(1) car -0,1 < 1 et f est constante sur [-1; 2].
 - c) f(-6.9) > f(-6.3) car -6.9 < -6.3 et f est décroissante sur [-7; -6].
- ▶2. f(-2,7) > f(7,1) car d'après le signe de la fonction f(-2,7) > 0 et f(7,1) < 0 (par contre, on ne peut pas utiliser le sens de variation qui change sur l'intervalle [-2,7;7,1]).
- ▶3. On ne peut pas comparer f(-6,5) et f(6,3) car la fonction f n'est pas monotone (elle change de sens de variation) sur [-6,5; 6,3].

Corrigé de l'exercice 3

- ▶1. a) f(-1,4) = f(-0,5) car -1,4 < -0,5 et f est constante sur [-2; 0].
 - **b)** f(-4,1) < f(-3) car -4,1 < -3 et f est croissante sur [-5; -2].
 - c) f(4,2) > f(4,6) car 4,2 < 4,6 et f est décroissante sur [4; 5].
- ▶2. On ne peut pas comparer f(-3,6) et f(2,6) car la fonction f n'est pas monotone (elle change de sens de variation) sur [-3,6; 2,6].
- ▶3. f(0,1) > f(-4,1) car d'après le signe de la fonction f(0,1) > 0 et f(-4,1) < 0 (par contre, on ne peut pas utiliser le sens de variation qui change sur l'intervalle [-4,1; 0,1]).